


Veneto 2015: frequenze e diffusione delle specie ornitiche e confronto anni 2013-2015

Emanuele Stival (red.)

Venezia, 2016



Rilevatori: Luca Boscain, Antonio Bossi, Matteo Cargasacchi, Michele Cassol, Stefano Castelli, Ernesto Cavallini, Giovanni Cellini, Giangaetano Dalle Vedove, Davide de Marchi, Carlotta Fassina, Roberto Lerco, Ivan Martini, Francesco Mezzavilla, Maria-Giovanna Mitri, Angelo Nardo, Alessandro Paiusco, Menotti Passarella, Atos Pastorini, Michele Pegorer, Fabio Piccolo, Giulio Piras, Vanni Polo, Franco Salvini, Francesco Scarton, Arno Schneider, Cesare Sent, Giacomo Sgorlon, Maurizio Sighele, Emanuele Stival, Aldo Tonelli, Oliviero Trebbi, Corrado Zanini.

Introduzione

Il presente lavoro si prefigge lo scopo di analizzare la frequenza di osservazione e la diffusione delle specie ornitiche nel Veneto nell'anno 2015 e il confronto della diffusione anche con il 2013 e il 2014. A questo scopo è stato chiesto a vari ornitologi e birdwatchers di fornire le loro osservazioni personali.

Metodi e risultati

Sono pervenuti 58759 dati bruti forniti da 32 rilevatori (anno 2015) e relativi ad osservazioni casuali compiute in 382 comuni del Veneto (BL 55, PD 71, RO 22, TV 64, VE 41, VI 62, VR 67). Sono state scartate le specie indeterminate e fatte confluire le sottospecie nelle relative specie. Sono state considerate solo le specie accettate nella Check list CISO-COI del 2009 con l'aggiunta del Piccione domestico (o Piccione di città, *Columba livia var. domestica*). Una specie rilevata, il Piccione selvatico, *Columba livia*,. probabilmente errore di inserimento non è stata considerata.

In totale sono state registrate 303 specie (Tabelle I, II e III).

I dati raccolti ed elaborati in fogli di lavoro con l'applicativo Microsoft excel interessano 382 Comuni del Veneto e sono relativi a 364 giorni dell'anno (su 365) I dati sono stati opportunamente elaborati e riassunti in più tabelle. La tabella I riporta la lista delle specie e le relative provincie dove queste sono state rilevate comprensiva della diffusione delle singole specie espresse come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevate e il numero totale dei Comuni con dati. Le 20 specie che sono risultate più diffuse sono nell'ordine: Merlo, Poiana, Gheppio, Cornacchia grigia, Fringuello, Pettiroso, Cinciallegra, Airone cenerino, Ghiandaia, Capinera, Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Gazza, Colombaccio, Rondine, Storno, Scricciolo, Ballerina bianca, Tortora dal collare, Passera d'Italia. Quest'ultima specie nel 2014 era in 18° posizione è ora 20° sopravanzata da Balestruccio, Picchio rosso maggiore e Scricciolo. La tabella II riporta la lista delle specie e le relative frequenze di rilevamento nei vari mesi dell'anno espresse, per ciascun mese, come numero dei giorni nei quali ogni specie è stata rilevata sul numero dei giorni con osservazioni nel mese. Le 20 specie che sono risultate più di frequente osservazione sono nell'ordine: Gheppio, Merlo, Garzetta, Airone cenerino, Gabbiano reale, Gazza, Cornacchia grigia, Colombaccio, Poiana, Storno, Germano reale, Gabbiano comune, Tortora dal collare, Cinciallegra, Ghiandaia, Airone guardabuoi, Cormorano, Picchio verde, Gallinella d'acqua, Fringuello. La tabella III riporta la diffusione delle specie suddivisa per fasce altitudinali (0-199 m, 200-599 m, >= 600 m) espresse come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevate e il numero totale dei Comuni con dati. La tabella IV riporta infine il confronto della diffusione delle specie per i tre anni per i quali sono stati raccolti dati (2013-2014); le diffusioni sono espresse come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevate e il numero totale dei Comuni con dati. Nel 2015 sono state osservate 15 specie che non erano state registrate nel 2013 o nel 2014: Cigno minore, Oca egiziana, Anatra muta, Coturnice, Grifone, Poiana calzata, Croccolone, Piovanello pettorale, Piovanello violetto, Falaropo beccosottile, Gabbiano glauco, Tortora delle palme, Picchio tridattilo, Averla isabellina, Zigolo capinero. D'altro canto 26 specie registrate nel 2013 o nel 2014 non sono state osservate nel 2015: Oca granaiola, Oca collarosso, Cigno selvatico, Moretta dal collare, Moretta codona, Pesciaiola, Berta maggiore, Aquila minore, Piviere orientale, Piro piro del Terek, Gabbiano tridattilo, Sterna di Rueppell, Labbo codalunga, Cuculo dal ciuffo, Falco della regina, Averla cenerina, Averla capirossa, Beccofrusone, Lù forestiero, Salciaiola, Usignolo maggiore, Balia dal collare, Pigliamosche pettirosso, Monachella, Pispola golarossa, Ciuffolotto scarlatto.

Ringraziamenti - Ringrazio tutti i rilevatori per aver messo a disposizione i propri dati e Francesco Mezzavilla per alcuni utili consigli.

Bibliografia

Brichetti P. e Fracasso G. 2015 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista Italiana di Ornitologia 85 (1): 31-50.

Tabella I. Diffusione delle specie nelle varie provincie Venete e diffusione totale espresse come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevate e il numero dei Comuni con dati nel 2015.

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/ totale Comuni con dati								Totale
		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR		
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	1,8%	1,4%	0,0%	0,0%	19,5%	1,6%	0,0%	2,9%	
Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,5%	
Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	1,8%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	
Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	2,4%	0,0%	0,0%	0,5%	
Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	4,9%	0,0%	0,0%	0,8%	
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	7,3%	8,5%	18,2%	23,4%	34,1%	1,6%	14,9%	14,1%	
Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	2,4%	0,0%	4,5%	1,3%	
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	0,0%	1,4%	18,2%	3,1%	31,7%	0,0%	3,0%	5,8%	
Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	0,0%	1,4%	0,0%	7,8%	4,9%	0,0%	0,0%	2,1%	
Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	1,6%	4,5%	1,6%	
Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	1,6%	1,5%	0,8%	
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	14,6%	0,0%	3,0%	2,9%	
Fischione	<i>Anas penelope</i>	0,0%	0,0%	9,1%	1,6%	12,2%	0,0%	3,0%	2,6%	
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	18,2%	35,2%	36,4%	40,6%	53,7%	19,4%	43,3%	34,6%	
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	0,0%	0,0%	13,6%	1,6%	19,5%	1,6%	1,5%	3,7%	
Codone	<i>Anas acuta</i>	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	9,8%	0,0%	3,0%	2,1%	
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	5,5%	5,6%	13,6%	7,8%	31,7%	0,0%	10,4%	9,2%	
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	3,6%	2,8%	18,2%	1,6%	36,6%	0,0%	10,4%	8,1%	
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	9,8%	0,0%	11,9%	3,4%	
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	3,6%	1,4%	13,6%	6,3%	14,6%	0,0%	9,0%	5,8%	
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	0,0%	1,4%	9,1%	3,1%	4,9%	0,0%	3,0%	2,4%	
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	3,6%	2,8%	4,5%	9,4%	9,8%	0,0%	9,0%	5,5%	
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	0,0%	1,4%	4,5%	0,0%	2,4%	0,0%	1,5%	1,0%	
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,3%	
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,5%	
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,8%	
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	1,8%	2,8%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	1,3%	
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	9,1%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	3,2%	7,5%	3,7%	
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	0,0%	1,4%	13,6%	0,0%	12,2%	0,0%	1,5%	2,6%	
Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%	
Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,3%	
Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,8%	
Fagiano di monte	<i>Lyrurus tetrix</i>	0,0%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	3,2%	3,0%	1,8%	
Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,5%	
Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	7,3%	0,0%	0,0%	1,0%	
Starna	<i>Perdix perdix</i>	0,0%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	0,0%	1,5%	1,0%	
Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	0,0%	1,4%	0,0%	6,3%	7,3%	3,2%	11,9%	4,7%	
Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	3,6%	21,1%	36,4%	31,3%	51,2%	14,5%	22,4%	23,6%	
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,5%	
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	0,0%	1,4%	4,5%	0,0%	4,9%	0,0%	7,5%	2,4%	
Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	5,5%	11,3%	18,2%	17,2%	36,6%	4,8%	19,4%	14,9%	
Svasso collarosso	<i>Podiceps grisegena</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,5%	
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	7,3%	14,1%	22,7%	15,6%	26,8%	1,6%	16,4%	13,6%	
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	19,5%	0,0%	9,0%	4,5%	
Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	0,0%	1,4%	13,6%	0,0%	26,8%	0,0%	0,0%	3,9%	
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	4,9%	0,0%	0,0%	0,8%	
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	0,0%	4,2%	0,0%	4,7%	9,8%	0,0%	4,5%	3,4%	
Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	0,0%	0,0%	22,7%	0,0%	9,8%	0,0%	9,0%	3,9%	
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,5%	
Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	0,0%	4,2%	13,6%	0,0%	9,8%	0,0%	0,0%	2,6%	
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	1,8%	2,8%	9,1%	3,1%	12,2%	0,0%	4,5%	3,9%	
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	0,0%	4,2%	9,1%	4,7%	14,6%	0,0%	0,0%	3,7%	
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	3,6%	15,5%	27,3%	12,5%	31,7%	0,0%	7,5%	11,8%	
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	1,8%	1,4%	22,7%	1,6%	26,8%	1,6%	3,0%	5,8%	
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	0,0%	47,9%	40,9%	39,1%	73,2%	19,4%	32,8%	34,6%	
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	18,2%	53,5%	45,5%	35,9%	63,4%	29,0%	55,2%	42,4%	
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	0,0%	4,2%	27,3%	9,4%	36,6%	0,0%	11,9%	9,9%	
Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	1,8%	19,7%	27,3%	23,4%	68,3%	14,5%	26,9%	23,8%	
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	7,3%	43,7%	31,8%	35,9%	65,9%	22,6%	35,8%	34,0%	
Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%	
Sula	<i>Morus bassanus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,3%	
Marangone minore	<i>Microcarbo pygmeus</i>	1,8%	5,6%	27,3%	29,7%	65,9%	1,6%	0,0%	15,2%	
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	9,8%	0,0%	0,0%	1,8%	
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	10,9%	25,4%	22,7%	29,7%	61,0%	11,3%	35,8%	27,2%	
Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	0,0%	1,4%	18,2%	9,4%	12,2%	0,0%	1,5%	4,5%	
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis ptilorvus</i>	16,4%	14,1%	0,0%	23,4%	9,8%	6,5%	19,4%	14,4%	
Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	3,6%	4,2%	0,0%	6,3%	2,4%	0,0%	7,5%	3,9%	
Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,5%	
Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	14,5%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	9,7%	9,0%	5,5%	

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale Comuni con dati									
		Provincie								Totale	
		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR			
Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	12,7%	29,6%	18,2%	42,2%	46,3%	12,9%	25,4%		27,0%	
Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	5,5%	0,0%	0,0%	3,1%	4,9%	3,2%	6,0%		3,4%	
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	0,0%	14,1%	27,3%	20,3%	46,3%	3,2%	14,9%		15,7%	
Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	0,0%	1,4%	13,6%	1,6%	24,4%	3,2%	10,4%		6,3%	
Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	2,4%	1,6%	0,0%		1,0%	
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	0,0%	1,4%	22,7%	1,6%	17,1%	1,6%	1,5%		4,2%	
Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	1,8%	4,2%	0,0%	3,1%	4,9%	0,0%	0,0%		2,1%	
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	14,5%	1,4%	0,0%	10,9%	14,6%	3,2%	10,4%		8,1%	
Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%		0,3%	
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	41,8%	40,8%	31,8%	64,1%	63,4%	30,6%	61,2%		48,7%	
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	1,8%	9,9%	13,6%	17,2%	34,1%	0,0%	11,9%		11,5%	
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,5%		0,8%	
Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%		0,5%	
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	2,4%	0,0%	0,0%		0,5%	
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	5,5%	32,4%	40,9%	26,6%	58,5%	4,8%	34,3%		26,7%	
Folaga	<i>Fulica atra</i>	5,5%	12,7%	18,2%	20,3%	34,1%	6,5%	23,9%		16,5%	
Gru	<i>Grus grus</i>	1,8%	7,0%	4,5%	10,9%	22,0%	1,6%	4,5%		7,1%	
Occhione	<i>Burhinus oediconemus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	2,4%	0,0%	0,0%		0,8%	
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	0,0%	0,0%	27,3%	0,0%	17,1%	0,0%	1,5%		3,7%	
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	0,0%	1,4%	13,6%	0,0%	26,8%	1,6%	13,4%		6,5%	
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	12,2%	0,0%	0,0%		2,1%	
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	1,8%	4,2%	22,7%	18,8%	41,5%	1,6%	20,9%		13,9%	
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	9,8%	0,0%	0,0%		1,6%	
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	0,0%	1,4%	9,1%	0,0%	17,1%	0,0%	1,5%		2,9%	
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	14,6%	0,0%	6,0%		3,4%	
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	7,3%	7,0%	18,2%	7,8%	17,1%	8,1%	6,0%		8,9%	
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	17,1%	0,0%	0,0%		2,6%	
Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	1,5%		0,5%	
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	0,0%	0,0%	0,0%	4,7%	4,9%	0,0%	0,0%		1,3%	
Frullino	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	2,4%	0,0%	0,0%		0,5%	
Croccolone	<i>Gallinago media</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%		0,3%	
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	0,0%	4,2%	18,2%	4,7%	26,8%	1,6%	7,5%		7,1%	
Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	0,0%	1,4%	13,6%	0,0%	9,8%	0,0%	1,5%		2,4%	
Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	7,3%	0,0%	0,0%		1,0%	
Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	0,0%	0,0%	9,1%	1,6%	19,5%	0,0%	1,5%		3,1%	
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	0,0%	1,4%	18,2%	1,6%	22,0%	0,0%	0,0%		3,9%	
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	19,5%	0,0%	3,0%		3,4%	
Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	1,8%	1,4%	13,6%	0,0%	19,5%	0,0%	1,5%		3,7%	
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	0,0%	1,4%	4,5%	0,0%	7,3%	0,0%	0,0%		1,3%	
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	0,0%	4,2%	22,7%	0,0%	26,8%	0,0%	6,0%		6,0%	
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	0,0%	5,6%	18,2%	7,8%	29,3%	3,2%	7,5%		8,4%	
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	1,8%	4,2%	18,2%	1,6%	24,4%	1,6%	10,4%		7,1%	
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	3,6%	7,0%	18,2%	9,4%	24,4%	6,5%	9,0%		9,7%	
Volta pietre	<i>Arenaria interpres</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	7,3%	0,0%	0,0%		1,0%	
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	0,0%	1,4%	9,1%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%		1,0%	
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	12,2%	0,0%	0,0%		1,8%	
Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	7,3%	0,0%	1,5%		1,8%	
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	4,9%	0,0%	3,0%		1,3%	
Piovanello pettorale	<i>Calidris melanotos</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,3%	
Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	0,0%	0,0%	18,2%	0,0%	2,4%	0,0%	1,5%		1,6%	
Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%		0,5%	
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	0,0%	1,4%	13,6%	0,0%	17,1%	0,0%	4,5%		3,7%	
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%		0,5%	
Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	0,0%	0,0%	18,2%	1,6%	12,2%	0,0%	10,4%		4,5%	
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%		0,3%	
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	0,0%	1,4%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,8%	
Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%		1,3%	
Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1,8%	15,5%	18,2%	28,1%	43,9%	8,1%	32,8%		20,7%	
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%		0,5%	
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	0,0%	1,4%	27,3%	17,2%	36,6%	0,0%	0,0%		8,6%	
Gavina	<i>Larus canus</i>	0,0%	4,2%	9,1%	6,3%	31,7%	0,0%	13,4%		8,1%	
Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%		0,3%	
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	4,9%	0,0%	1,5%		1,0%	
Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	0,0%	0,0%	4,5%	1,6%	4,9%	0,0%	4,5%		1,8%	
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	10,9%	31,0%	50,0%	34,4%	58,5%	14,5%	31,3%		30,1%	
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	1,6%	7,3%	0,0%	1,5%		1,6%	
Sterna zamperere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	0,0%	2,8%	36,4%	0,0%	14,6%	0,0%	0,0%		4,2%	
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	0,0%	0,0%	18,2%	0,0%	9,8%	0,0%	0,0%		2,1%	
Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	0,0%	1,4%	13,6%	0,0%	17,1%	0,0%	0,0%		2,9%	
Fratricello	<i>Sternula albifrons</i>	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	12,2%	0,0%	0,0%		2,1%	
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	3,6%	4,2%	18,2%	3,1%	34,1%	0,0%	1,5%		6,8%	
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	0,0%	1,4%	9,1%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%		1,0%	
Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%		0,5%	
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	0,0%	1,4%	9,1%	1,6%	9,8%	0,0%	1,5%		2,4%	
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	2,4%	0,0%	3,0%		1,0%	
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%		0,8%	
Piccione domestico	<i>Columba livia var. domestica</i>	3,6%	21,1%	36,4%	18,8%	58,5%	17,7%	32,8%		24,6%	

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale Comuni con dati								
		Provincie								Totale
		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR		
Colombella	<i>Columba oenas</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	14,6%	0,0%	6,0%	2,9%	
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	12,7%	43,7%	40,9%	42,2%	63,4%	14,5%	52,2%	37,7%	
Tortora selvatica	<i>Sireptopelia turtur</i>	3,6%	15,5%	31,8%	10,9%	24,4%	9,7%	9,0%	12,8%	
Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	10,9%	36,6%	45,5%	29,7%	63,4%	21,0%	49,3%	34,8%	
Tortora delle palme	<i>Spilopelia senegalensis</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,3%	
Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	25,5%	16,9%	36,4%	23,4%	41,5%	22,6%	31,3%	26,4%	
Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	0,0%	5,6%	13,6%	1,6%	17,1%	0,0%	0,0%	3,9%	
Assiolo	<i>Otus scops</i>	5,5%	1,4%	9,1%	3,1%	9,8%	0,0%	1,5%	3,4%	
Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%	
Allocco	<i>Strix aluco</i>	3,6%	8,5%	0,0%	6,3%	2,4%	0,0%	3,0%	3,9%	
Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Civetta	<i>Athene noctua</i>	7,3%	18,3%	31,8%	17,2%	29,3%	6,5%	7,5%	14,7%	
Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Gufo comune	<i>Asio otus</i>	0,0%	8,5%	9,1%	7,8%	14,6%	0,0%	4,5%	5,8%	
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,8%	
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	1,8%	5,6%	0,0%	1,6%	4,9%	3,2%	1,5%	2,9%	
Rondone maggiore	<i>Tachymarptis melba</i>	7,3%	1,4%	0,0%	6,3%	0,0%	1,6%	9,0%	4,2%	
Rondone comune	<i>Apus apus</i>	21,8%	26,8%	36,4%	37,5%	36,6%	24,2%	19,4%	27,7%	
Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,8%	
Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	0,0%	1,4%	4,5%	4,7%	2,4%	0,0%	1,5%	1,8%	
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	7,3%	22,5%	18,2%	26,6%	48,8%	12,9%	23,9%	22,3%	
Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	0,0%	12,7%	31,8%	15,6%	29,3%	3,2%	7,5%	11,8%	
Upupa	<i>Upupa epops</i>	1,8%	12,7%	18,2%	7,8%	26,8%	3,2%	13,4%	10,7%	
Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	9,1%	5,6%	4,5%	4,7%	4,9%	4,8%	7,5%	6,0%	
Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	30,9%	32,4%	36,4%	50,0%	53,7%	22,6%	49,3%	39,0%	
Picchio tridattilo	<i>Picoides tridactylus</i>	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	20,0%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%	1,6%	9,0%	6,3%	
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	20,0%	45,1%	18,2%	50,0%	61,0%	25,8%	46,3%	39,5%	
Picchio cinerino	<i>Picus canus</i>	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	1,3%	
Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	4,5%	1,8%	
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	23,6%	50,7%	40,9%	64,1%	63,4%	33,9%	56,7%	48,2%	
Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	1,8%	12,7%	18,2%	14,1%	29,3%	1,6%	7,5%	10,7%	
Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	0,0%	0,0%	4,5%	4,7%	9,8%	0,0%	4,5%	2,9%	
Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	5,5%	14,1%	22,7%	21,9%	24,4%	3,2%	13,4%	13,9%	
Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	5,5%	12,7%	22,7%	20,3%	31,7%	1,6%	14,9%	14,1%	
Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	3,0%	0,8%	
Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	1,0%	
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	18,2%	8,5%	18,2%	18,8%	22,0%	8,1%	17,9%	15,2%	
Averla isabellina	<i>Lanius isabellinus</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	1,8%	0,0%	4,5%	0,0%	14,6%	1,6%	4,5%	3,1%	
Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	9,1%	11,3%	27,3%	20,3%	39,0%	11,3%	14,9%	17,0%	
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	36,4%	42,3%	31,8%	56,3%	58,5%	16,1%	40,3%	40,3%	
Gazza	<i>Pica pica</i>	18,2%	39,4%	68,2%	31,3%	65,9%	25,8%	46,3%	38,5%	
Nucifolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	27,3%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	3,2%	4,5%	7,3%	
Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	21,8%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	0,0%	9,0%	5,5%	
Taccola	<i>Corvus monedula</i>	1,8%	14,1%	22,7%	12,5%	31,7%	3,2%	13,4%	12,6%	
Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	1,8%	2,8%	0,0%	7,8%	4,9%	0,0%	0,0%	2,6%	
Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	20,0%	5,6%	0,0%	7,8%	17,1%	4,8%	3,0%	8,4%	
Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	25,5%	45,1%	36,4%	46,9%	56,1%	37,1%	71,6%	46,6%	
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	32,7%	0,0%	0,0%	20,3%	0,0%	12,9%	20,9%	13,9%	
Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	47,3%	0,0%	0,0%	10,9%	4,9%	4,8%	23,9%	14,1%	
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	25,5%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	6,5%	9,0%	6,8%	
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	16,4%	0,0%	0,0%	10,9%	0,0%	3,2%	14,9%	7,3%	
Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	16,4%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	3,2%	6,0%	4,5%	
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	16,4%	31,0%	22,7%	40,6%	31,7%	16,1%	46,3%	30,4%	
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	27,3%	39,4%	36,4%	54,7%	51,2%	38,7%	55,2%	44,0%	
Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	0,0%	1,4%	13,6%	1,6%	26,8%	0,0%	11,9%	6,3%	
Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,3%	
Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,5%	
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	3,6%	4,2%	22,7%	12,5%	19,5%	3,2%	20,9%	11,0%	
Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	0,0%	4,2%	31,8%	1,6%	22,0%	1,6%	6,0%	6,5%	
Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%	
Topino	<i>Riparia riparia</i>	1,8%	7,0%	22,7%	1,6%	17,1%	1,6%	7,5%	6,5%	
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	27,3%	43,7%	36,4%	37,5%	56,1%	16,1%	49,3%	37,7%	
Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	47,3%	7,0%	0,0%	18,8%	0,0%	12,9%	11,9%	15,4%	
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	32,7%	23,9%	18,2%	29,7%	43,9%	19,4%	25,4%	27,5%	
Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,3%	
Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	3,6%	14,1%	31,8%	21,9%	43,9%	12,9%	26,9%	20,2%	
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	16,4%	39,4%	9,1%	39,1%	41,5%	30,6%	38,8%	33,0%	
Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	0,0%	2,8%	0,0%	4,7%	14,6%	0,0%	3,0%	3,4%	
Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	36,4%	28,2%	22,7%	40,6%	39,0%	16,1%	47,8%	33,8%	
Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	7,3%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	2,4%	
Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	5,5%	7,0%	4,5%	4,7%	12,2%	0,0%	4,5%	5,2%	
Lui di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	
Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1,8%	7,0%	9,1%	1,6%	29,3%	1,6%	13,4%	8,1%	
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	0,0%	0,0%	4,5%	1,6%	4,9%	0,0%	1,5%	1,3%	

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale Comuni con dati							
		Province						Totale	
		BL	PD	RO	TV	VE	VI		VR
Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	0,0%	4,2%	4,5%	0,0%	9,8%	0,0%	1,5%	2,4%
Cannaiaola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	3,6%	2,8%	9,1%	6,3%	34,1%	0,0%	4,5%	7,1%
Cannaiaola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	0,0%	5,6%	9,1%	7,8%	34,1%	4,8%	6,0%	8,4%
Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	1,8%	7,0%	13,6%	6,3%	7,3%	3,2%	7,5%	6,0%
Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	3,0%	1,0%
Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	1,8%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	0,0%	2,8%	18,2%	1,6%	24,4%	0,0%	0,0%	4,5%
Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	32,7%	33,8%	40,9%	42,2%	46,3%	33,9%	50,7%	39,8%
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	1,5%	1,8%
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	5,5%	4,2%	0,0%	4,7%	9,8%	1,6%	4,5%	4,5%
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	3,6%	2,8%	0,0%	4,7%	7,3%	3,2%	9,0%	4,7%
Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,3%	0,0%	0,0%	0,8%
Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	0,0%	7,0%	4,5%	1,6%	4,9%	1,6%	9,0%	4,2%
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	3,6%	9,9%	4,5%	10,9%	17,1%	1,6%	20,9%	10,2%
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	29,1%	19,7%	13,6%	23,4%	29,3%	16,1%	26,9%	23,0%
Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	38,2%	25,4%	18,2%	51,6%	39,0%	24,2%	49,3%	36,6%
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	23,6%	1,4%	0,0%	14,1%	0,0%	1,6%	13,4%	8,6%
Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	1,8%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	1,8%
Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	10,9%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	3,2%	6,0%	3,7%
Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	9,1%	1,4%	0,0%	1,6%	2,4%	6,5%	4,5%	3,9%
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	10,9%	39,4%	50,0%	40,6%	61,0%	21,0%	50,7%	37,4%
Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	9,1%	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%	3,2%	3,0%	3,4%
Merlo	<i>Turdus merula</i>	41,8%	50,7%	36,4%	56,3%	65,9%	46,8%	62,7%	52,6%
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	18,2%	5,6%	4,5%	14,1%	22,0%	3,2%	10,4%	11,0%
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	3,6%	4,2%	4,5%	7,8%	4,9%	3,2%	6,0%	5,0%
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	27,3%	8,5%	13,6%	23,4%	22,0%	6,5%	14,9%	16,2%
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	18,2%	2,8%	4,5%	20,3%	2,4%	6,5%	9,0%	9,7%
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	9,1%	12,7%	18,2%	12,5%	19,5%	6,5%	11,9%	12,0%
Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	41,8%	38,0%	22,7%	51,6%	51,2%	40,3%	59,7%	45,5%
Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,5%
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	12,7%	19,7%	45,5%	14,1%	41,5%	14,5%	22,4%	21,2%
Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1,8%	11,3%	9,1%	6,3%	12,2%	3,2%	9,0%	7,3%
Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	34,5%	14,1%	22,7%	23,4%	26,8%	12,9%	22,4%	21,7%
Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	18,2%	7,0%	13,6%	21,9%	12,2%	9,7%	17,9%	14,4%
Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	1,5%	0,5%
Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	7,3%	9,9%	18,2%	10,9%	22,0%	4,8%	7,5%	10,2%
Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	1,8%	8,5%	22,7%	14,1%	39,0%	14,5%	25,4%	16,5%
Culbiano	<i>Oenanthe oenanthe</i>	14,5%	5,6%	4,5%	12,5%	14,6%	6,5%	17,9%	11,3%
Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	16,4%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	4,8%	1,5%	3,9%
Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	32,7%	23,9%	36,4%	21,9%	53,7%	37,1%	46,3%	34,8%
Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	7,3%	14,1%	27,3%	10,9%	39,0%	11,3%	23,9%	17,3%
Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%
Sordone	<i>Prunella collaris</i>	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,8%
Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	18,2%	11,3%	4,5%	21,9%	14,6%	8,1%	23,9%	15,7%
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	3,6%	8,5%	27,3%	3,1%	29,3%	4,8%	11,9%	10,2%
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	23,6%	19,7%	0,0%	25,0%	14,6%	19,4%	28,4%	20,9%
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	47,3%	21,1%	18,2%	34,4%	39,0%	40,3%	44,8%	36,1%
Calandro	<i>Anthus campestris</i>	0,0%	1,4%	4,5%	1,6%	0,0%	0,0%	6,0%	1,8%
Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	1,8%	2,8%	9,1%	10,9%	22,0%	4,8%	14,9%	8,9%
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	20,0%	2,8%	4,5%	15,6%	4,9%	6,5%	10,4%	9,7%
Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	7,3%	1,4%	13,6%	4,7%	12,2%	4,8%	10,4%	6,8%
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	50,9%	36,6%	27,3%	51,6%	39,0%	43,5%	59,7%	46,1%
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	3,6%	4,2%	4,5%	18,8%	12,2%	8,1%	11,9%	9,4%
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	9,1%	15,5%	4,5%	21,9%	17,1%	1,6%	7,5%	11,5%
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	30,9%	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%	6,5%	4,5%	7,3%
Verdone	<i>Chloris chloris</i>	14,5%	18,3%	18,2%	28,1%	41,5%	14,5%	23,9%	22,3%
Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	9,1%	2,8%	9,1%	14,1%	9,8%	4,8%	14,9%	9,2%
Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	5,5%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Crociera	<i>Loxia curvirostra</i>	12,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	2,6%
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	30,9%	29,6%	31,8%	28,1%	48,8%	19,4%	31,3%	30,4%
Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	10,9%	31,0%	13,6%	25,0%	19,5%	12,9%	22,4%	20,4%
Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	23,6%	11,3%	13,6%	21,9%	19,5%	6,5%	9,0%	14,7%
Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	1,8%	4,2%	9,1%	0,0%	12,2%	3,2%	9,0%	5,0%
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	7,3%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	3,2%	10,4%	5,5%
Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	9,1%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	6,5%	3,0%	3,7%
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,8%
Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	0,0%	9,9%	0,0%	0,0%	4,9%	1,6%	14,9%	5,2%
Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,3%
Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	0,0%	8,5%	22,7%	18,8%	31,7%	4,8%	16,4%	13,1%
Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	2,4%	0,0%	3,0%	1,0%

Tabella III. Diffusione delle specie nelle varie fasce altitudinali espresse come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevate e il numero dei Comuni con dati nel 2015. Le frecce colorate indicano dai valori più alti (freccia verde verso l'alto) a scalare verso i valori più bassi (freccia gialla verso alto e destra, freccia gialla verso destra, freccia gialla verso destra e in basso, freccia rossa verso il basso)

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale					
		Comuni con dati			Fascia altitudinale		
		0-199 m	200-599 m	>=600 m	0-199 m	200-599 m	>=600 m
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	↘	3,2%	↘	2,8%	↘	0,0%
Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	↘	1,1%	↘	0,0%	↘	0,0%
Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	↘	0,7%	↘	1,4%	↘	0,0%
Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	↘	0,7%	↘	0,0%	↘	0,0%
Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	↘	1,1%	↘	0,0%	↘	0,0%
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	↗	17,6%	↘	2,8%	↘	3,1%
Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	↘	0,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	↘	1,8%	↘	0,0%	↘	0,0%
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	↗	7,9%	↘	0,0%	↘	0,0%
Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	↘	2,9%	↘	0,0%	↘	0,0%
Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	↘	1,8%	↘	1,4%	↘	0,0%
Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	↘	0,7%	↘	1,4%	↘	0,0%
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	↘	3,9%	↘	0,0%	↘	0,0%
Fischione	<i>Anas penelope</i>	↘	3,6%	↘	0,0%	↘	0,0%
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	↗	42,7%	↗	14,1%	↘	4,1%
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	↗	5,0%	↘	0,0%	↘	0,0%
Codone	<i>Anas acuta</i>	↘	2,9%	↘	0,0%	↘	0,0%
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	↗	11,5%	↘	2,8%	↘	2,0%
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	↗	10,4%	↘	2,8%	↘	0,0%
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	↗	4,3%	↘	0,0%	↘	1,0%
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	↗	7,2%	↘	2,8%	↘	0,0%
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	↘	2,9%	↘	1,4%	↘	0,0%
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	↗	6,8%	↘	2,8%	↘	0,0%
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	↘	1,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	↘	0,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	↘	1,1%	↘	0,0%	↘	0,0%
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	↘	1,1%	↘	0,0%	↘	0,0%
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	↘	1,4%	↘	1,4%	↘	0,0%
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	↘	2,5%	↗	8,5%	↘	1,0%
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	↘	3,6%	↘	0,0%	↘	0,0%
Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	↘	0,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>	↘	0,0%	↘	0,0%	↘	1,0%
Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	↘	0,0%	↘	0,0%	↘	3,1%
Fagiano di monte	<i>Lyrurus tetrix</i>	↘	0,0%	↘	0,0%	↗	7,1%
Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	↘	0,0%	↘	0,0%	↘	1,0%
Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	↘	0,0%	↘	0,0%	↘	2,0%
Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	↘	1,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Sterna	<i>Perdix perdix</i>	↘	1,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	↘	3,9%	↘	1,4%	↗	6,1%
Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	↗	29,4%	↗	11,3%	↘	3,1%
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	↘	0,7%	↘	0,0%	↘	0,0%
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	↘	3,2%	↘	0,0%	↘	0,0%
Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	↘	0,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	↗	19,4%	↘	2,8%	↘	1,0%
Svasso collarosso	<i>Podiceps grisegena</i>	↘	0,7%	↘	0,0%	↘	0,0%
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	↗	16,5%	↗	7,0%	↘	1,0%
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	↘	0,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	↗	6,1%	↘	0,0%	↘	0,0%
Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	↗	5,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	↘	0,7%	↘	1,4%	↘	0,0%
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	↗	4,7%	↘	0,0%	↘	0,0%
Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	↗	5,4%	↘	0,0%	↘	0,0%
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	↘	0,7%	↘	0,0%	↘	0,0%
Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	↘	3,6%	↘	0,0%	↘	0,0%
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	↗	5,0%	↘	1,4%	↘	0,0%
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	↗	5,0%	↘	0,0%	↘	0,0%
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	↗	15,4%	↘	2,8%	↘	0,0%
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	↗	7,5%	↘	1,4%	↘	0,0%

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale					
		Comuni con dati					
		Fascia altitudinale					
		0-199 m	200-599 m	>=600 m			
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	↑	47,3%	↓	0,0%	↓	0,0%
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	↑	52,3%	↑	18,3%	↔	3,1%
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	↑	13,6%	↓	0,0%	↓	0,0%
Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	↑	31,5%	↔	4,2%	↓	0,0%
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	↑	44,8%	↔	7,0%	↓	0,0%
Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Sula	<i>Morus bassanus</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Marangone minore	<i>Microcarbo pygmeus</i>	↑	20,4%	↓	1,4%	↓	0,0%
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	↔	2,5%	↓	0,0%	↓	0,0%
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	↑	34,1%	↔	12,7%	↓	1,0%
Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	↔	5,7%	↓	1,4%	↓	0,0%
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	↔	7,5%	↑	15,5%	↑	28,6%
Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	1,0%
Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	↔	2,2%	↔	5,6%	↔	7,1%
Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	↓	0,7%	↔	4,2%	↑	18,4%
Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	↑	26,5%	↑	16,9%	↑	20,4%
Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	↓	1,1%	↔	5,6%	↔	6,1%
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	↑	21,1%	↔	2,8%	↓	0,0%
Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	↔	6,1%	↔	2,8%	↔	5,1%
Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	↔	5,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	↔	2,5%	↓	0,0%	↓	1,0%
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	↔	5,4%	↔	12,7%	↔	7,1%
Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	1,0%
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	↑	45,9%	↑	42,3%	↑	41,8%
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	↑	15,1%	↔	2,8%	↓	0,0%
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↔	3,1%
Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	↑	35,1%	↔	5,6%	↓	0,0%
Folaga	<i>Fulica atra</i>	↑	21,1%	↔	4,2%	↓	1,0%
Gru	<i>Grus grus</i>	↔	8,6%	↔	2,8%	↓	1,0%
Occhione	<i>Burhinus oedicnemus</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	↔	5,0%	↓	0,0%	↓	0,0%
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	↔	9,0%	↓	0,0%	↓	0,0%
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	↔	2,9%	↓	0,0%	↓	0,0%
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	↑	18,3%	↓	1,4%	↓	1,0%
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	↔	2,2%	↓	0,0%	↓	0,0%
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	↔	3,9%	↓	0,0%	↓	0,0%
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	↔	4,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	↔	10,4%	↔	7,0%	↓	0,0%
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	↔	3,6%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↔	2,0%
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	↓	1,4%	↓	1,4%	↓	0,0%
Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Croccolone	<i>Gallinago media</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	↔	9,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	↔	3,2%	↓	0,0%	↓	0,0%
Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	↔	4,3%	↓	0,0%	↓	0,0%
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	↔	5,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	↔	4,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	↔	4,7%	↓	0,0%	↓	1,0%
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	↔	1,8%	↓	0,0%	↓	0,0%
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	↔	8,2%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	↔	11,1%	↓	1,4%	↓	0,0%
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	↔	9,3%	↓	0,0%	↓	1,0%
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	↔	12,2%	↔	4,2%	↓	0,0%
Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	↔	2,5%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	↔	2,5%	↓	0,0%	↓	0,0%

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale					
		Comuni con dati					
		Fascia altitudinale					
		0-199 m	200-599 m	>=600 m			
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	↓	1,8%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piovanello pettorale	<i>Calidris melanotos</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	↓	2,2%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	↓	5,0%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	↓	6,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	↓	1,8%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	↑	28,0%	↓	1,4%	↓	0,0%
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	↓	11,8%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gavina	<i>Larus canus</i>	↓	11,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	↓	2,5%	↓	0,0%	↓	0,0%
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	↑	38,4%	↓	9,9%	↓	1,0%
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	↓	2,2%	↓	0,0%	↓	0,0%
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	↓	5,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	↓	2,9%	↓	0,0%	↓	0,0%
Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	↓	3,9%	↓	0,0%	↓	0,0%
Fraticele	<i>Sternula albifrons</i>	↓	2,9%	↓	0,0%	↓	0,0%
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	↓	8,6%	↓	2,8%	↓	0,0%
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	↓	3,2%	↓	0,0%	↓	0,0%
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Piccione domestico	<i>Columba livia var. domestica</i>	↑	31,9%	↓	7,0%	↓	2,0%
Colombella	<i>Columba oenas</i>	↓	3,6%	↓	0,0%	↓	1,0%
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	↑	44,1%	↑	16,9%	↓	11,2%
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	↑	15,4%	↓	9,9%	↓	0,0%
Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	↑	44,1%	↑	14,1%	↓	1,0%
Tortora delle palme	<i>Spilopelia senegalensis</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	↑	23,7%	↑	22,5%	↑	25,5%
Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	↓	5,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Assiolo	<i>Otus scops</i>	↓	3,6%	↓	4,2%	↓	0,0%
Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	↓	0,0%	↓	1,4%	↓	0,0%
Allocco	<i>Strix aluco</i>	↓	3,6%	↓	2,8%	↓	3,1%
Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	1,0%
Civetta	<i>Athene noctua</i>	↑	17,6%	↓	8,5%	↓	1,0%
Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	1,0%
Gufo comune	<i>Asio otus</i>	↓	7,2%	↓	0,0%	↓	2,0%
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	↓	3,2%	↓	2,8%	↓	0,0%
Rondone maggiore	<i>Tachymartus melba</i>	↓	1,4%	↓	5,6%	↓	9,2%
Rondone comune	<i>Apus apus</i>	↑	27,2%	↑	16,9%	↑	21,4%
Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	↓	2,5%	↓	0,0%	↓	0,0%
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	↑	28,0%	↓	9,9%	↓	0,0%
Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	↑	15,8%	↓	1,4%	↓	1,0%
Upupa	<i>Upupa epops</i>	↓	12,9%	↓	5,6%	↓	1,0%
Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	↓	4,7%	↓	8,5%	↓	4,1%
Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	↓	0,0%	↓	1,4%	↓	0,0%
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	↑	40,1%	↑	31,0%	↑	23,5%
Picchio tridattilo	<i>Picoides tridactylus</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	2,0%
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	↓	0,4%	↓	5,6%	↑	19,4%
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	↑	43,0%	↑	33,8%	↑	16,3%
Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	↓	0,4%	↓	2,8%	↓	2,0%
Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	↓	1,1%	↓	4,2%	↓	1,0%
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	↑	50,2%	↑	15,5%	↑	41,8%
Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	↑	14,3%	↓	1,4%	↓	0,0%

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale					
		Comuni con dati					
		Fascia altitudinale					
		0-199 m	200-599 m	>=600 m			
Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	↘	3,9%	↓	0,0%	↓	0,0%
Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	↑	15,4%	↘	7,0%	↘	6,1%
Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	↑	14,0%	↘	9,9%	↘	11,2%
Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	↘	9,7%	↘	7,0%	↑	28,6%
Averla isabellina	<i>Lanius isabellinus</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	↘	2,5%	↘	1,4%	↘	4,1%
Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	↑	20,8%	↘	9,9%	↓	0,0%
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	↑	38,4%	↑	32,4%	↑	33,7%
Gazza	<i>Pica pica</i>	↑	47,7%	↑	18,3%	↘	5,1%
Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	↓	0,0%	↘	2,8%	↑	26,5%
Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↑	21,4%
Taccola	<i>Corvus monedula</i>	↑	16,5%	↘	2,8%	↓	0,0%
Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	↘	3,2%	↓	0,0%	↓	1,0%
Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	↘	5,7%	↘	11,3%	↘	9,2%
Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	↑	50,5%	↑	38,0%	↑	25,5%
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	↓	1,1%	↑	14,1%	↑	45,9%
Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	↘	3,2%	↘	7,0%	↑	42,9%
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	↓	0,0%	↘	2,8%	↑	24,5%
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	↓	1,1%	↑	19,7%	↑	14,3%
Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	↓	0,0%	↓	1,4%	↑	16,3%
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	↑	31,2%	↑	23,9%	↑	18,4%
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	↑	44,1%	↑	47,9%	↑	26,5%
Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	↘	8,6%	↓	0,0%	↓	0,0%
Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	↓	0,0%	↘	2,8%	↓	0,0%
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	↘	10,8%	↓	1,4%	↘	11,2%
Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	↘	9,0%	↓	0,0%	↓	0,0%
Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Topino	<i>Riparia riparia</i>	↘	8,6%	↓	1,4%	↓	0,0%
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	↑	39,1%	↑	25,4%	↑	23,5%
Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	↘	7,9%	↑	26,8%	↑	23,5%
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	↑	24,4%	↑	22,5%	↑	26,5%
Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	↑	26,9%	↘	2,8%	↓	0,0%
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	↑	33,3%	↑	36,6%	↘	11,2%
Lùì grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	↘	4,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Lùì piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	↑	28,7%	↑	22,5%	↑	39,8%
Lùì bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	↓	0,7%	↘	2,8%	↘	6,1%
Lùì verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	↘	5,0%	↘	8,5%	↓	1,0%
Lùì di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	↘	10,8%	↓	1,4%	↓	0,0%
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	↘	1,8%	↓	0,0%	↓	0,0%
Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	↘	3,2%	↓	0,0%	↓	0,0%
Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	↘	9,0%	↘	2,8%	↓	0,0%
Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	↘	11,5%	↓	0,0%	↓	0,0%
Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	↘	7,5%	↘	4,2%	↓	0,0%
Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	↓	1,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	↓	0,4%	↓	1,4%	↓	0,0%
Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	↘	6,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	↓	0,7%	↘	2,8%	↓	0,0%
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	↑	39,1%	↑	35,2%	↑	31,6%
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	↘	1,8%	↓	1,4%	↓	1,0%
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	↘	2,9%	↓	0,0%	↘	9,2%
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	↘	3,2%	↘	7,0%	↘	4,1%
Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↓	0,0%
Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	↘	4,3%	↘	8,5%	↓	0,0%
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	↘	10,4%	↘	5,6%	↘	8,2%
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	↑	17,6%	↑	14,1%	↑	32,7%
Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	↑	33,0%	↑	25,4%	↑	38,8%
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	↘	3,9%	↑	16,9%	↑	13,3%
Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	↓	1,1%	↘	2,8%	↘	2,0%

Nome	Nome scientifico	Numero dei Comuni con rilevazione specie/totale					
		Comuni con dati					
		Fascia altitudinale					
		0-199 m	200-599 m	>=600 m			
Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	↓	1,1%	↓	0,0%	↔	11,2%
Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	↔	2,2%	↔	9,9%	↔	2,0%
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	↑	45,2%	↑	23,9%	↔	5,1%
Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↔	12,2%
Merlo	<i>Turdus merula</i>	↑	51,6%	↑	43,7%	↑	40,8%
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	↔	7,9%	↔	8,5%	↑	14,3%
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	↔	4,7%	↔	4,2%	↔	3,1%
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	↔	11,1%	↔	7,0%	↑	26,5%
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	↔	2,2%	↔	2,8%	↑	29,6%
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	↔	13,3%	↔	7,0%	↔	6,1%
Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	↑	43,4%	↑	42,3%	↑	38,8%
Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	↑	26,2%	↔	12,7%	↓	1,0%
Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	↔	7,2%	↔	7,0%	↔	4,1%
Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	↑	15,4%	↔	7,0%	↑	36,7%
Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	↔	11,5%	↑	14,1%	↑	13,3%
Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↔	2,0%
Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	↔	10,0%	↔	4,2%	↔	9,2%
Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	↑	15,8%	↔	7,0%	↑	15,3%
Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	↔	6,5%	↔	2,8%	↑	23,5%
Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	↓	0,4%	↔	12,7%	↔	5,1%
Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	↑	36,2%	↑	29,6%	↑	14,3%
Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↓	0,0%
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	↑	20,8%	↔	8,5%	↔	2,0%
Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	1,0%
Sordone	<i>Prunella collaris</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↔	3,1%
Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	↑	14,0%	↔	11,3%	↑	15,3%
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	↔	12,9%	↓	1,4%	↓	1,0%
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	↑	20,8%	↑	25,4%	↔	7,1%
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	↑	31,5%	↑	22,5%	↑	41,8%
Calandro	<i>Anthus campestris</i>	↓	1,1%	↓	1,4%	↔	3,1%
Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	↔	10,0%	↓	1,4%	↔	5,1%
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	↔	2,2%	↔	2,8%	↑	29,6%
Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	↔	5,7%	↓	1,4%	↔	9,2%
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	↑	38,4%	↑	52,1%	↑	53,1%
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	↔	9,0%	↔	7,0%	↔	6,1%
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	↔	12,2%	↔	9,9%	↔	5,1%
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	↓	0,0%	↔	7,0%	↑	24,5%
Verdone	<i>Chloris chloris</i>	↑	21,9%	↑	19,7%	↑	13,3%
Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	↔	5,0%	↓	1,4%	↑	20,4%
Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↔	3,1%
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↔	10,2%
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	↑	28,0%	↑	19,7%	↑	28,6%
Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	1,0%
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	↑	21,5%	↑	15,5%	↔	8,2%
Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	↔	12,2%	↔	12,7%	↑	14,3%
Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	↔	5,0%	↓	0,0%	↔	5,1%
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	↓	0,7%	↓	1,4%	↑	18,4%
Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephala</i>	↓	0,4%	↓	0,0%	↓	0,0%
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	↓	1,1%	↔	7,0%	↔	6,1%
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	↓	0,7%	↓	1,4%	↓	0,0%
Zigolo nero	<i>Emberiza cirulus</i>	↔	3,6%	↔	11,3%	↔	4,1%
Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	↓	0,0%	↓	0,0%	↓	1,0%
Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	↑	17,6%	↓	1,4%	↓	0,0%
Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	↓	0,7%	↓	0,0%	↔	2,0%

Tabella IV. Diffusione delle specie negli anni 2013-2015 espresse come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevate e il numero dei Comuni con dati nei rispettivi anni.

Nome	Nome scientifico	Num. Comuni rilevazione specie/totale Comuni con dati		
		2013	Anni 2014	2015
Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	0,64%	0,00%	0,00%
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	4,82%	2,54%	2,88%
Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	3,22%	1,90%	0,79%
Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	1,29%	2,22%	0,79%
Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	0,64%	0,00%	0,52%
Oca collarosso	<i>Branta ruficollis</i>	0,64%	0,00%	0,00%
Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	1,93%	0,95%	0,79%
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	15,76%	15,24%	14,14%
Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	0,32%	0,00%	0,00%
Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	0,00%	0,00%	1,31%
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	6,75%	4,13%	5,76%
Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	1,93%	2,22%	2,09%
Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	0,00%	0,00%	1,57%
Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	0,64%	0,95%	0,79%
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	6,11%	2,54%	2,88%
Fischione	<i>Anas penelope</i>	5,47%	2,54%	2,62%
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	36,33%	34,60%	34,55%
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	7,72%	3,49%	3,66%
Codone	<i>Anas acuta</i>	2,57%	3,49%	2,09%
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	9,00%	4,44%	9,16%
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	8,36%	5,40%	8,12%
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	4,82%	2,54%	3,40%
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	7,40%	5,40%	5,76%
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	1,29%	1,90%	2,36%
Moretta dal collare	<i>Aythya collaris</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	5,14%	4,44%	5,50%
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	0,64%	0,63%	1,05%
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	0,32%	0,32%	0,26%
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	1,93%	1,27%	0,79%
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	0,32%	0,63%	0,79%
Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	2,25%	0,95%	1,31%
Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	0,32%	0,32%	0,00%
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	4,18%	2,54%	3,66%
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	2,89%	3,17%	2,62%
Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	0,32%	0,32%	0,26%
Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>	0,00%	0,32%	0,26%
Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	0,32%	0,00%	0,79%
Fagiano di monte	<i>Lyrurus tetrix</i>	2,25%	1,27%	1,83%
Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	0,32%	0,32%	0,26%
Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	0,00%	0,00%	0,52%
Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	0,32%	0,00%	1,05%
Starna	<i>Perdix perdix</i>	1,29%	1,59%	1,05%
Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	4,18%	3,49%	4,71%
Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	19,29%	20,32%	23,56%
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	1,29%	1,27%	0,52%
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	2,57%	1,90%	2,36%
Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	0,00%	0,95%	0,26%
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	18,97%	13,02%	14,92%
Svasso collarosso	<i>Podiceps grisegena</i>	1,61%	1,27%	0,52%
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	14,15%	14,29%	13,61%
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	0,32%	0,32%	0,26%
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	5,14%	5,40%	4,45%
Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	3,22%	3,81%	3,93%
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	1,29%	1,59%	0,79%
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	3,22%	4,13%	3,40%
Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	2,25%	2,22%	3,93%
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	1,29%	0,95%	0,52%
Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	2,89%	2,54%	2,62%
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	3,22%	3,17%	3,93%
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	6,43%	4,44%	3,66%
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	10,61%	9,21%	11,78%
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	5,47%	4,13%	5,76%
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	25,08%	24,44%	34,55%
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	40,51%	43,17%	42,41%
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	9,97%	13,33%	9,95%

Nome	Nome scientifico	Num. Comuni rilevazione specie/totale Comuni con dati		
		2013	Anni 2014	2015
Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	26,69%	22,22%	23,82%
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	31,83%	29,84%	34,03%
Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	0,96%	0,32%	0,26%
Sula	<i>Morus bassanus</i>	0,32%	1,59%	0,26%
Marangone minore	<i>Microcarbo pygmeus</i>	13,50%	12,70%	15,18%
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	1,61%	1,59%	1,83%
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	29,90%	25,40%	27,23%
Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	5,14%	2,86%	4,45%
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	18,01%	16,19%	14,40%
Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Biancone	<i>Circus gallicus</i>	6,11%	6,03%	3,93%
Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	0,32%	0,32%	0,52%
Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	0,32%	0,32%	0,00%
Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	3,86%	3,17%	5,50%
Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	30,23%	22,54%	26,96%
Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	2,89%	2,54%	3,40%
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	18,97%	12,38%	15,71%
Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	10,93%	9,21%	6,28%
Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	0,00%	1,27%	1,05%
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	6,75%	3,81%	4,19%
Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	1,61%	0,95%	2,09%
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	9,65%	6,98%	8,12%
Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	44,05%	45,40%	48,69%
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	10,29%	6,67%	11,52%
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	0,32%	2,22%	0,79%
Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	1,29%	0,63%	0,52%
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	1,29%	2,54%	0,52%
Folaga	<i>Fulica atra</i>	19,94%	13,65%	16,49%
Gru	<i>Grus grus</i>	7,40%	4,13%	7,07%
Occhione	<i>Burhinus oedicephalus</i>	0,64%	0,63%	0,79%
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	3,54%	3,81%	3,66%
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	3,86%	3,17%	2,09%
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	13,83%	11,75%	13,87%
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	3,54%	1,27%	1,57%
Piviere orientale	<i>Pluvialis fulva</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	2,57%	3,49%	2,88%
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	2,57%	1,59%	3,40%
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	9,00%	6,35%	8,90%
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1,61%	2,22%	2,62%
Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	0,00%	0,63%	0,52%
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	2,89%	1,27%	1,31%
Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	0,64%	0,00%	0,52%
Crocolone	<i>Gallinago media</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	6,43%	5,40%	7,07%
Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	2,25%	2,22%	2,36%
Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	1,93%	1,59%	1,05%
Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	2,25%	3,17%	3,14%
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	3,86%	3,81%	3,93%
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	4,50%	4,13%	3,40%
Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	3,86%	2,54%	3,66%
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	0,96%	1,27%	1,31%
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	5,14%	5,40%	6,02%
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	7,72%	6,03%	8,38%
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	5,47%	4,76%	7,07%
Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	0,00%	0,95%	0,00%
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	9,65%	8,25%	9,69%
Volta pietre	<i>Arenaria interpres</i>	1,29%	1,27%	1,05%
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	1,29%	0,32%	1,05%
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	1,93%	2,54%	1,83%
Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	1,61%	1,59%	1,83%
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	1,29%	0,95%	1,31%
Piovanello pettorale	<i>Calidris melanotos</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	1,61%	1,59%	1,57%
Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	0,00%	0,00%	0,52%
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	3,86%	3,49%	3,66%
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	0,00%	0,32%	0,52%
Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	4,18%	4,44%	4,45%
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	0,64%	0,63%	0,79%
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	0,64%	0,00%	0,00%

Nome	Nome scientifico	Num. Comuni rilevazione specie/totale Comuni con dati		
		2013	Anni 2014	2015
Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	0,64%	1,27%	1,31%
Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	30,87%	25,08%	20,68%
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	1,61%	2,22%	0,79%
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	9,00%	11,11%	8,64%
Gavina	<i>Larus canus</i>	10,61%	6,98%	8,12%
Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	1,93%	0,95%	1,05%
Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachimans</i>	2,25%	1,90%	1,83%
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	32,80%	31,43%	30,10%
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	2,25%	2,22%	1,57%
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	2,57%	3,81%	4,19%
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	2,89%	2,86%	2,09%
Sterna di Rueppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	3,22%	3,17%	2,88%
Fratricello	<i>Sternula albifrons</i>	2,89%	2,86%	2,09%
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	6,43%	6,03%	6,81%
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	1,29%	1,27%	1,05%
Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1,61%	1,59%	0,52%
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	2,57%	3,81%	2,36%
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	0,00%	1,27%	1,05%
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	1,61%	1,59%	0,79%
Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	0,32%	0,63%	0,00%
Piccione selvatico	<i>Columba livia</i>	0,32%	0,32%	0,52%
Colombella	<i>Columba oenas</i>	1,29%	2,54%	2,88%
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	37,94%	39,05%	37,70%
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	12,54%	11,43%	12,83%
Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	35,69%	35,87%	34,82%
Tortora delle palme	<i>Spilopelia senegalensis</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	0,64%	0,00%	0,00%
Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	22,83%	24,76%	26,44%
Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	1,61%	2,22%	3,93%
Assiolo	<i>Otus scops</i>	3,86%	3,17%	3,40%
Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	0,64%	0,32%	0,26%
Allocco	<i>Strix aluco</i>	4,50%	4,44%	3,93%
Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	0,64%	0,32%	0,26%
Civetta	<i>Athene noctua</i>	15,76%	12,70%	14,66%
Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	0,64%	0,63%	0,26%
Gufo comune	<i>Asio otus</i>	6,11%	4,44%	5,76%
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	1,29%	0,32%	0,79%
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	2,25%	3,49%	2,88%
Rondone maggiore	<i>Tachymarptis melba</i>	5,79%	5,40%	4,19%
Rondone comune	<i>Apus apus</i>	30,87%	30,48%	27,75%
Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	0,32%	1,27%	0,79%
Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	3,22%	3,17%	1,83%
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	18,01%	16,51%	22,25%
Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	9,97%	9,21%	11,78%
Upupa	<i>Upupa epops</i>	16,08%	13,33%	10,73%
Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	7,40%	4,76%	6,02%
Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	0,64%	0,95%	0,26%
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	34,73%	32,06%	39,01%
Picchio tridattilo	<i>Picooides tridactylus</i>	0,00%	0,00%	0,52%
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	4,82%	5,40%	6,28%
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	33,44%	36,19%	39,53%
Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	0,64%	0,32%	1,31%
Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	1,61%	0,95%	1,83%
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	51,13%	45,40%	48,17%
Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	4,82%	3,49%	10,73%
Falco della regina	<i>Falco eleonorae</i>	0,32%	0,32%	0,00%
Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	4,50%	4,76%	2,88%
Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	16,08%	18,73%	13,87%
Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	15,43%	12,06%	14,14%
Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	0,96%	0,63%	0,79%
Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	0,96%	1,90%	1,05%
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	17,36%	14,29%	15,18%
Averla isabellina	<i>Lanius isabellinus</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	0,64%	0,00%	0,00%
Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	1,93%	2,22%	3,14%
Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	14,15%	13,65%	17,02%
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	39,23%	42,22%	40,31%
Gazza	<i>Pica pica</i>	39,87%	38,73%	38,48%

Nome	Nome scientifico	Num. Comuni rilevazione specie/totale Comuni con dati		
		2013	Anni 2014	2015
Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	5,47%	7,30%	7,33%
Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	5,14%	3,81%	5,50%
Taccola	<i>Corvus monedula</i>	11,25%	10,48%	12,57%
Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	1,61%	1,59%	2,62%
Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	11,25%	8,89%	8,38%
Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	53,70%	53,97%	46,60%
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	12,86%	12,38%	13,87%
Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	0,96%	0,00%	0,00%
Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	18,97%	14,92%	14,14%
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	5,14%	7,30%	6,81%
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	8,36%	8,57%	7,33%
Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	5,79%	4,44%	4,45%
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	27,97%	22,22%	30,37%
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	42,77%	45,08%	43,98%
Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	5,79%	3,17%	6,28%
Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	0,32%	0,32%	0,26%
Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	1,93%	0,95%	0,52%
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	11,58%	7,62%	10,99%
Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	8,04%	5,71%	6,54%
Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	0,64%	0,63%	0,26%
Topino	<i>Riparia riparia</i>	9,32%	5,08%	6,54%
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	38,59%	40,95%	37,70%
Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	12,22%	13,02%	15,45%
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	28,94%	32,70%	27,49%
Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	0,32%	0,63%	0,26%
Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	15,43%	15,56%	20,16%
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	29,58%	29,52%	32,98%
Lù grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	7,07%	2,86%	3,40%
Lù piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	30,23%	27,94%	33,25%
Lù bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	0,96%	1,27%	2,36%
Lù verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	7,07%	4,13%	5,24%
Lù forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Lù di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	0,00%	0,32%	0,26%
Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	7,72%	6,03%	8,12%
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	1,29%	0,63%	1,31%
Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1,93%	1,59%	2,36%
Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	9,32%	6,98%	7,07%
Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	8,36%	4,76%	8,38%
Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	6,11%	5,40%	6,02%
Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	0,32%	0,32%	1,05%
Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	0,32%	0,32%	0,52%
Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	0,64%	0,95%	0,00%
Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	2,25%	3,17%	4,45%
Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	0,32%	0,63%	1,05%
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	40,51%	36,51%	39,79%
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	1,29%	2,22%	1,83%
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	3,54%	2,86%	4,45%
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	5,47%	6,03%	4,71%
Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	0,64%	1,59%	0,79%
Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	4,18%	5,40%	4,19%
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	10,93%	8,57%	10,21%
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	23,47%	18,73%	23,04%
Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	28,62%	26,03%	36,65%
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	7,07%	5,08%	8,64%
Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	1,29%	0,95%	1,83%
Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	3,86%	2,86%	3,66%
Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	2,25%	3,17%	3,93%
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	41,16%	40,63%	37,43%
Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	3,22%	4,13%	3,40%
Merlo	<i>Turdus merula</i>	53,05%	55,56%	52,62%
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	7,40%	6,98%	10,99%
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	5,14%	2,54%	4,97%
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	14,15%	14,60%	16,23%
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	8,04%	7,62%	9,69%
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	12,86%	11,11%	12,04%
Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	40,19%	37,78%	45,55%
Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	1,29%	0,00%	0,52%
Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	19,29%	18,10%	21,20%
Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	9,65%	6,98%	7,33%
Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	0,32%	0,00%	0,00%

Nome	Nome scientifico	Num. Comuni rilevazione specie/totale Comuni con dati		
		2013	Anni 2014	2015
Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	0,00%	0,32%	0,00%
Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	27,97%	22,54%	21,73%
Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	14,15%	15,24%	14,40%
Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	0,64%	0,63%	0,52%
Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	0,32%	0,63%	0,26%
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	7,72%	7,30%	10,21%
Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	12,54%	10,79%	16,49%
Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	11,58%	11,43%	11,26%
Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	0,32%	0,32%	0,00%
Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	3,22%	3,49%	3,93%
Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	38,91%	33,65%	34,82%
Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	0,64%	1,27%	0,52%
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	18,65%	17,14%	17,28%
Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	0,96%	1,27%	0,26%
Sordone	<i>Prunella collaris</i>	1,93%	0,63%	0,79%
Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	17,04%	11,75%	15,71%
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	14,15%	9,84%	9,95%
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	19,29%	16,83%	20,94%
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	31,83%	28,25%	36,13%
Calandro	<i>Anthus campestris</i>	1,61%	1,27%	1,83%
Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	11,25%	8,89%	8,90%
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	8,36%	7,30%	9,69%
Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	0,32%	0,00%	0,00%
Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	6,43%	8,57%	6,81%
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	50,16%	47,62%	46,07%
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	10,93%	4,76%	9,42%
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	9,32%	8,89%	11,52%
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	5,47%	7,30%	7,33%
Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	0,32%	0,00%	0,00%
Verdone	<i>Chloris chloris</i>	23,15%	20,95%	22,25%
Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	13,50%	10,48%	9,16%
Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	0,96%	0,95%	1,05%
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	3,54%	5,71%	2,62%
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	32,48%	27,94%	30,37%
Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	0,32%	0,32%	0,26%
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	23,79%	20,95%	20,42%
Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	13,50%	7,94%	14,66%
Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	7,07%	5,40%	4,97%
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	5,47%	5,40%	5,50%
Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephala</i>	0,00%	0,32%	0,26%
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	4,50%	2,22%	3,66%
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	0,32%	0,63%	0,79%
Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	5,14%	6,03%	5,24%
Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	0,00%	0,00%	0,26%
Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	17,04%	12,38%	13,09%
Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	0,96%	0,95%	1,05%